

1920
n° 2-4

~~bord apical en scie, et l'inférieure pointue à l'extré-
mité avec un lobe arrondi au bord interne; la partie
inférieure du lobe latéral porte quatre fortes soies
dont une avec extrémité arquée et une autre (la plus
forte) avec extrémité anguleuse. Le forcipule est large,
un peu arqué au milieu, tronqué à l'extrémité, sans trace
d'article terminal, avec de petites soies vers le bout. Go-
napophyse (harpe) avec une touffe de soies courtes. Bras
pénien (harpagon) terminé en une pièce tridentée~~

BUENOS AIRES, Mai, 1920.



AVES DEL VALLE DE NILAHUE

POR

Rafael BARROS V.

Agrónomo; Jefe de la Estación de Piscicultura de Río Blanco

(SEGUNDA PARTE)

Sólo había entregado a la imprenta la primera parte de este trabajo, cuando inesperadamente me visitó la desgracia y en un instante desaparecieron colecciones científicas, apuntes sobre aves silvestres y otros temas, biblioteca, etc. Un terrible incendio consumió el 23 de Febrero del ~~corriente año~~ ^{año pasado}, a la 1½ A. M., la casa que habitaba en Río Blanco y todo lo que en ella había desapareció.

He rehecho los originales de este trabajo que, mediante nuevas observaciones, resulta más completo. Además, en la nomenclatura he introducido algunas reformas de acuerdo con cambios que han hecho los ornitólogos en

los últimos años. No obstante, en este punto mi labor es incompleta y aun temo haber cometido errores por la escasez o falta de literatura, pues no he podido consultar toda la necesaria. Agradecería sinceramente a los autores que se sirvieran enviarme sus trabajos.

Como base de la nomenclatura me he servido de la obra del DR. ROBERTO DABBENE, jefe de la Sección de Vertebrados del Museo de Buenos Aires «*Ornitología Argentina*» T. I., en «*Anales del Museo Nacional de Historia Natural*» de Buenos Aires, Serie 3.^a-Tomo XI-1910, que, entre otras publicaciones, debo a la generosidad de mi excelente amigo el Prof. Dr. Carlos E. Porter

VI. Orden CHARADRIIFORMES

7. Familia CHARADRIIDAE (Carádridos)

11.—Pollo del campo, *Oreophilus ruficollis* (Wagler). Es bastante escaso. Suele verse en pequeños grupos en las partes altas, descubiertas, algo llanas, de los cerros vecinos, desde Enero hasta fines de Abril. Raras veces bajan al plan.

12.—Treile, Queltehue, *Belonopterus chilensis* (Molina).—Llega desde la vecindad del mar después de las primeras lluvias de otoño, y a principios de Junio empieza a distribuirse en parejas y a diseminarse en el valle, manteniéndose algunos en grupos hasta Agosto o Septiembre. Es ave que comienza a poner muy temprano; los que más se adelantan suelen hacerlo hasta en Julio. A mediados de la primavera vuelven a la costa acompañados de sus crías; pero algunos ejemplares quedan en la vecindad de los pajonales hasta en Diciembre.

13.—Porotero, *Gallinago paraguaiiae* (Vieillot).—Escaso; llega a las partes más húmedas y vegas a principios o a mediados de la estación lluviosa, se reproduce allí y suelen encontrarse ejemplares hasta en Diciembre; después se va a la costa. Se le ve de a pares.

VII. Orden ARDEIFORMES

8. Familia ARDEIDAE (Garzas, huairavos)

14.—Garza grande, *Herodias egretta* (Gmelin).—Según las noticias que he obtenido de personas que han vivido más de medio siglo en el valle de Nilahue, hará treinta o treinta y cinco años, llegaba todavía en crecido número todos los años y siempre venía a anidar en colonias en los árboles que rodean ciertas lagunas y pajonales, constituyendo lo que en otros países, como Venezuela, por ejemplo, se denomina *garceros*. Por desgracia se les perseguía encarnizadamente; se cazaban por su plumaje y, lo que es peor, algunas personas recorrían los *garceros* y robaban los huevos por canastadas, sin que los dueños de los fundos lo impidieran, lo que ha causado la extinción absoluta de esta ave en todo el valle. ¡Triste es comprobar que la misma despiadada persecución se le ha hecho en toda la República para que las damas de Chile y otros países puedan obedecer a los caprichos de la *moda* que les ordena adornar de plumas los sombreros, imitando en esto a los pueblos de más escasa cultura; por lo que esta especie, como también la siguiente, están en vías de desaparecer!

15.—Garza chica, garceta, *Egretta ^{alba-thula (Molina)} candidissima* (Gmelin).—Como la especie anterior, ésta ha desaparecido de Nilahue y no se muestra en la región desde hace muchos años: éste es el fruto de la persecución estúpida que se ha hecho a estas aves y que concluirá también por hacer desaparecer otras especies interesantes, no sólo del valle, sino del país entero, pues en todas partes se las destruye. ¡Cuando llegará el día en que nuestro Gobierno prohíba en absoluto la importación y exportación de plumas de aves silvestres, como sabiamente han legislado los Estados Unidos de Norte América!

16.—Huairavo *Nycticorax cyanocephalus* (Molina).—Vive en las quebradas boscosas de los cerros vecinos. Con el crepúsculo baja a la llanura; abandona su refugio de los árboles y va a la orilla de las lagunas y de los esteros,

todo el año. En ocasiones se encuentran nidos en el plan; pero de preferencia esta especie anida en los cerros más altos, siempre en el suelo, como el gallinazo

XI. Orden ACCIPITRIFORMES

12. Familia FALCONIDAE (Falcónidos)

24.—Traro *Polyborus plancus* (Miller).—Algo escaso; se le ve más a menudo en el plan; se reproduce en la región y construye su nido en la cima de los árboles más altos. Todo el año se le encuentra en Nilahue.

25.—Tíuque, tríuque, chíuque (chimango en la República Argentina).—*Milvago chimango* (Vieillot).—Muy común todo el año. En ciertos inviernos son abundantes; recuerdo que en el de 1902 fueron numerosísimos. Abundan más en el plan que en los cerros; para dormir se reúnen en los montes de espino, *Acacia cavenia*, del plan, y anida de preferencia también en la cima de estos árboles.

26.—Aguila. *Geranoaetus melanoleucus* (Vieillot).—Es escasa; raras veces se presenta en las partes bajas; se le ve de vez en cuando en los cerros o en la vecindad de éstos y anida en los más altos y enmontados, en los árboles más corpulentos.

27.—Peuco. *Parabuteo unicinctus* (Temminck).—No es raro y suele causar en algunos años perjuicios bastante grandes en los gallineros de las localidades que se habita a visitar; ataca y mata aun a las gallinas adultas; muchas veces llevan el ataque entre dos. Parece que se reproduce en los cerros altos y enmontados.

28.—Bailarín, peuco blanco ratonero. ~~Falco fusco~~ ^{Elanoides} ~~caerulescens~~ (Vieillot).—Algo escaso; viajero en la región; se le ve tanto en el plan como en los faldeos y cerros, casi siempre aislado.

29.—Halcón, peuco perdiguero. ~~Hypatriorchis~~ ^{Falco} ~~caerulescens~~ (Vieillot).—Más común que el anterior; pare-

ce sedentario en el valle, donde anida y se le encuentra todo el año; más frecuente en el plan que en los cerros; se oculta a veces en los montes de espino. Se le ve de a pares.

30.—**Gavilán** *Falco peregrinus Tunstall*.—Bastante escaso; suelen verse ejemplares, sobre todo en los planes descubiertos o poblados de arbustos, donde cazaavecitas. Por lo común se ve aislado.

31.—**Cernicalo** *Cerchneis sparveria cinnamomina* (Swainson).—Común sin ser abundante; se le encuentra tanto en el plan como en los cerros. Suele instalarse en la vecindad de las lagunas para procurarse alimento con mayor facilidad, compuesto principalmente de insectos que caza al vuelo. Anida en cuevas, en las paredes de los barrancos más profundos que hay en los cerros que limitan el valle.

(Continuará)

