

Queltehue de la puna *Vanellus resplendens*

Fernando Medrano

RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

fernandomedranomartinez@gmail.com



El *Queltehue de la puna* se encuentra ligado a zonas anegadas de la cordillera de los Andes, entre el sur de Colombia, y pasando por Ecuador, Perú y Bolivia, hasta el norte de Chile y Argentina (Wiersma y Kirwan 2018). Hellmayr (1932) describe su distribución entre el extremo norte y la provincia de Antofagasta, con pieles colectadas por Philippi, Sclater, Reed y Lane, distribución que se repite hasta la literatura contemporánea. La distribución altitudinal ha sido más controversial, con Hellmayr (1932) describiéndolo entre los 2.400–3.700 MSNM, Housse (1945) extendiendo dicha distribución a los 4.000 MSNM, Goodall et al. (1951) proponiendo una nueva distribución, entre los 4.000–5.000 y Jaramillo proponiendo una distribución entre los 3.500–5.000 MSNM. Los datos de este Atlas sugieren una distribución entre los 3.900–4.600 MSNM, con individuos errantes (probablemente en su primer ciclo) hasta el nivel del mar.

Su nidificación ha sido poco estudiada. Lane (sensu Hellmayr 1932) encontró un nido con huevos en diciembre, y Goodall et al. (1951) encontraron nidos con huevos en diciembre y enero. Para Argentina, Salvador (2015) compila los registros existentes y concluye que la postura de huevos ocurre entre noviembre y enero. El nido descrito por Salvador (1992) es una depresión de 10 cm de diámetro y 3,5 cm de profundidad, revestida de forma escasa de líquenes, pajitas y raicillas.

Se encuentra clasificado como en «PREOCUPACIÓN MENOR» (BirdLife International 2018) y a nivel nacional no ha sido evaluado. 🌿

METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

